

Antigen	Vârsta la care se face prima doză	Doze în seria primară, cu interval minim între doze	Serie primară întreruptă	Doze pentru cei care încep vaccinarea cu întârziere		Rapel
				Sub 12 luni	Peste 12 luni	
<b>Imunizare de rutină</b>						
<b>BCG</b>	Cât mai repede după naștere	1 doză	-	1 doză până la trei luni fără IDR la PPD, după 3 luni după IDR la PPD	1 doză după IDR la PPD. Se recomandă recuperarea vaccinării până la vârsta de 4 ani	Nu se recomandă
<b>Hepatita B</b>	În primele 24 de ore după naștere	Doza de la naștere plus 2 - 3 doze incluse în hexavalent (interval minim 4 săptămâni) <b>Atenție, la limita (2 ani Hexacima, 3 ani Infanrix Hexa)</b>	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	3 doze	3 doze Până la 15 ani se folosește doza pediatrică	Nu se recomandă
<b>Polio - IPV</b>	8 săptămâni	3 doze la interval de minimum 4 săptămâni	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	3 doze	3 doze	Dacă seria primară începe sub vârsta de 2 luni, rapelul se va administra la cel puțin 6 luni după ultima doză
<b>Vaccinuri cu DTP</b>	Minim 6 săptămâni	3 doze, la intervale de minim 4 săptămâni între ele	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	3doze	3 doze, dacă dozele se recuperează până la 4 ani	3 rapeluri: 12-23 luni (DTP), 4-7 ani (Td) și 9 - 15 ani (Td). La vârste peste 7 ani se va folosi doar Pertusiss Acelular Dacă vaccinarea începe în adolescențe, sunt necesare doar 5 doze pentru protecția pe termen lung
<b>Haemophilus Influenzae B</b>	Opțiunea 1	Minim 6 săptămâni	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	3 doze	1 doză. Nu se recomandă peste 5 ani, dacă este sănătos	Nu
	Opțiunea 2			2 - 3 doze (interval minim 8 săptămâni dacă e vorba de 2 doze, interval minim 4 săptămâni dacă e vorba de 3 doze)		2 - 3 doze

Antigen	Vârsta la care se face prima doză	Doze în seria primară, cu interval minim între doze	Serie primară întreruptă	Doze pentru cei care încep vaccinarea cu întârziere		Rapel	
				Sub 12 luni	Peste 12 luni		
<b>Imunizare de rutină</b>							
<b>Pneumococic conjugat</b>	PCV 10 (Synflorix)	Minim 6 săptămâni	3 doze (interval minim 4 săptămâni) sau 2 doze (interval minim 8 săptămâni)	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	2 - 3 doze	1 - 2 ani (2 doze) 2 - 5 ani la persoanele la risc (2 doze)	Rapel la 9 - 15 luni dacă urmează după o serie primară de 2 doze Încă un rapel la HIV+ sau NN prematur
	PCV 13 (Prevenar)						
<b>Rotaviral</b>	1 serotip (Rotarix)	Minim 6 săptămâni	2 doze cu minim 4 săptămâni între ele	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	2 doze	Nu se recomandă peste 24 de săptămâni!	Nu se recomandă
	5 serotip (Rotateq)		3 doze cu minim 4 săptămâni între ele		3 doze		
<b>Rujeola</b>		9 - 12 luni	2 doze cu minimum 4 săptămâni între ele	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	2 doze	2 doze	Nu
<b>Rubeolă</b>		9 - 12 luni	0 doză în vaccinul combinat (ROR)	-	1 doză	1 doză	Nu
<b>Oreion</b>		12 - 18 luni	2 doze în vaccinul combinat (ROR)	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	Nu se recomandă	2 doze	Nu se recomandă
<b>HPV</b>		Cât mai devreme după vârsta de 9 ani	2 doze (minimum 5 luni între ele)	Dacă prima doză s-a efectuat înainte de 15 ani, se continuă fără să se repete dozele anterioare	-	Fete: 9 - 14 ani 2 doze	Nu
<b>Imunizări în situații speciale</b>							
<b>Gripă (tri și tetravalent inactivat)</b>		6 luni	Sub 9 ani 2 doze la interval de min 4 săptămâni (1/doză l copilul mic) ≥ 9 ani - 1 doză	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	2 doze	< 9 ani -2 doze ≥ 9 ani:1 doză	Revaccinare anual cu o doză
<b>Varicelă</b>		12 - 18 luni	1 - 2 (4 săpt - 3 luni, depinde de producător)	Se continuă fără să se repete dozele anterioare	Nu	1 - 2 doze	

Pentru orice fel de nelămurire vă rugăm să apelați la noi, colegii voștri din Grupul de Vaccinologie  
[vaccinologie@snmf.ro](mailto:vaccinologie@snmf.ro)

